

ET SI C'ÉTAIT UN
ADDISON?

ZYCORTAL®

UNE MALADIE OBSCURE. UNE RÉPONSE CLAIRE.

Zycortal® en pratique

Pas de traitement
antérieur

Traitement antérieur
par fludrocortisone

Traitement antérieur
par fludrocortisone +
prednisolone

**Jour 1 pour tous les patients – Administrer une dose initiale de Zycortal®
de 2,2 mg/kg en injection sous-cutanée**

Jour 1 - En plus de Zycortal®,
administrer aussi 0,2-0,4 mg/kg
de prednisolone 1 x par jour

Jour 1 - Administrer la
fludrocortisone comme
auparavant

Jour 1 - Administrer la
fludrocortisone et la prednisolone
comme auparavant

Jour 10 et jour 25
après la première
injection de Zycortal®
- Examen clinique
de tous les chiens
et dosage des
électrolytes
Cf. tableau pour
le monitoring
et l'ajustement
posologique de
Zycortal®.

Jour 2 - Diminuer de moitié la
dose initiale de fludrocortisone et
administrer aussi 0,2-0,4 mg/kg
de prednisolone 1 x par jour

Jour 2 - Diminuer de moitié la
dose initiale de fludrocortisone
et augmenter la dose de
prednisolone à 0,2-0,4 mg/kg 1
x par jour (si la dose initiale était
inférieure)

Jour 3 - Administrer 1/4 de la
dose initiale de fludrocortisone
et poursuivre la prednisolone
comme décrit ci-dessus

Jour 3 - Administrer 1/4 de
la dose de fludrocortisone et
poursuivre la prednisolone
comme décrit ci-dessus

Jour 4 - Arrêter la fludrocortisone
et poursuivre la prednisolone
comme décrit ci-dessus

Jour 4 - Arrêter la fludrocortisone
et poursuivre la prednisolone
comme décrit ci-dessus